

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Rowatinex želučanootporne kapsule, meke

α -pinen, β -pinen, kamfen, borneol, anetol, fenhon, cineol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Rowatinex i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rowatinex?
3. Kako uzimati Rowatinex?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Rowatinex?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Rowatinex i za što se koristi?

Rowatinex pomaže u otapanju/razgradnji i uklanjanju (raspadanje i eliminacija) kamenaca iz urinarnog trakta.

Rowatinex kapsule namijenjene su za primjenu kod odraslih.

Prije upotrebe Rowatinexa neophodan je pregled kod liječnika specijalista koji će postaviti dijagnozu i savjetovati Vas oko uzimanja lijeka.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rowatinex?

Nemojte uzimati Rowatinex ako ste alergični (preosjetljivi) na neku djelatnu tvar: α -pinen, β -pinen, kamfen, borneol, anetol, fenhon, cineol ili neki drugi sastojak Rowatinexa (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi ili lijekove koji se razgrađuju u jetri ili izlučuju putem žuči.

Djeca

Ne preporučuje se primjena Rowatinex kapsula kod djece.

Drugi lijekovi i Rowatinex

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koji se dobiju bez recepta. To uključuje sljedeće:

- lijekove protiv zgrušavanja krvi (oralni antikoagulansi npr. varfarin)
- lijekove koji se razgrađuju u jetri ili izlučuju putem žuči (posavjetujte se sa Vašim liječnikom u vezi toga)

Trudnoća, dojenje i plodnost

Pitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja ikogjeg lijeka.

Primjena lijeka tijekom trudnoće ili dojenja se ne preporučuje.

Ako ste trudni ili dojite možete uzeti Rowatinex samo na savjet Vašeg liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Mala je vjerojatnost utjecaja Rowatinexa na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Rowatinex sadrži natrijev etilparahidroksibenzoat i natrijev propilparahidroksibenzoat.

Može uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene reakcije preosjetljivosti).

Rowatinex sadrži boju Sunset Yellow FCF (E110).

Može uzrokovati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Rowatinex?

Uvijek uzimajte Rowatinex točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako vam je rekao vaš liječnik ili ljekarnik. Ako niste sigurni provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Rowatinex kapsula se mora progutati cijela. Ne grizite i ne žvačite kapsule.

Uobičajeno doza za odrasle

Jedna kapsule 3 do 4 puta na dan prije jela.

Primjena u djece

Ne preporučuje se primjena Rowatinex kapsula kod djece.

Ako ste uzeli više Rowatinexa nego što ste trebali

Ako ste uzeli više kapsula nego što ste trebali, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom koji će poduzeti potrebne mjere.

Kod predoziranja može doći do iritacije želuca što može prouzročiti mučninu, povraćanje i dijareju.

Ako ste zaboravili uzeti Rowatinex

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako imate ikakvih daljnjih pitanja u vezi s uporabom ovoga lijeka, pitajte svojeg liječnika ili ljekarnika.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi Rowatinex može prouzročiti nuspojave ali se one ne moraju javiti kod svakoga bolesnika.

Kod manjeg broja bolesnika zabilježene su blage i prolazne želučane smetnje i povraćanje. Zabilježeni su slučajevi nepodnošljivosti/preosjetljivosti na lijek koji su se očitovali reakcijama na koži.

Prijavlivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava **navedenog u [Dodatku V](#)**.

Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati rowatinex

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Nemojte upotrebljavati Rowatinex nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan u mjesecu. Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rowatinex sadrži?

Djelatna tvar u svakoj želučanootpornoj kapsuli, mekoj sadrži: α -pinen 24,8 mg, β -pinen 6,2 mg, kamfen 15 mg, borneol 10 mg, anetol 4 mg, fenhon 4 mg, cineol 3 mg. Preostali sastojak je djevičansko maslinovo ulje.

Ovojnica kapsule sadrži: želatinu; glicerol 85%; natrijev etilparahidroksibenzoat (E215); natrijev propilparahidroksibenzoat (E217); Sunset Yellow FCF 85% (E110); Quinoline Yellow WS 70% (E104)

Kako Rowatinex izgleda i sadržaj pakiranja?

Rowatinex kapsule su žute, ovalne, meke želatinske, želučanootporne kapsule koje sadrže blijedo žutu do zelenkasto žutu otopinu s jakim aromatičnim mirisom.

Svako pakiranje sadrži 50 kapsula u blister pakiranju, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Rowa Pharmaceuticals, Ltd.
Newtown, Bantry, Co. Cork
Irska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Medical Intertrade d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 3
10 431 Sveta Nedelja
Tel: 01/3336036

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u lipnju 2019.